

STEVEN SPIELBERG DIGITAL YIDDISH LIBRARY

NO. 11358

KANSER

B. Dubovski



NATIONAL YIDDISH BOOK CENTER
AMHERST, MASSACHUSETTS

NATIONAL YIDDISH BOOK CENTER
AMHERST, MASSACHUSETTS
413 256-4900 | YIDDISH@BIKHER.ORG
WWW.YIDDISHBOOKCENTER.ORG



MAJOR FUNDING FOR THE
STEVEN SPIELBERG DIGITAL YIDDISH LIBRARY
WAS PROVIDED BY:

Lloyd E. Cotsen Trust
Arie & Ida Crown Memorial
The Seymour Grubman Family
David and Barbara B. Hirschhorn Foundation
Max Palevsky
Robert Price
Righteous Persons Foundation
Leif D. Rosenblatt
Sarah and Ben Torchinsky
Harry and Jeanette Weinberg Foundation
AND MEMBERS AND FRIENDS OF THE
National Yiddish Book Center



The *goldene pave*, or golden peacock, is a traditional symbol of Yiddish creativity. The inspiration for our colophon comes from a design by the noted artist Yechiel Hadani of Jerusalem, Israel.

The National Yiddish Book Center respects the copyright and intellectual property rights in our books. To the best of our knowledge, this title is either in the public domain or it is an orphan work for which no current copyright holder can be identified.

If you hold an active copyright to this work – or if you know who does – please contact us by phone at 413-256-4900 x153, or by email at digitallibrary@bikher.org

קאנסער

וואָס פאַר אַ קראַנקהייט דאָס איז.
ווער עס ליידט דערפון.
אורזאכען, סמנים און באהאַנדלונגען

פון

ד.ר. ב. דובאַווסקי



ניו-יאָרק

1945

פארווארט

רעדען אדער שרייבען, פאר'ן דורכשניטליכען עולם, וועגען קאנסער ווערט פון א סך דאקטוירים באטראכט אלס א זעהר ריזיקאלישע אונטערנעהמונג.

פאראן נערוועזע מענשען וועמען עס דאכט זיך אז זיי ליידען פון יעדער קראנקהייט וועגען וועלכער זיי הערען אדער ליינען. רעדט מען וועגן קאנסער ווערען אזעלכע מענשען „איבערצייגט" דאס זיי האבען עס, און זיי פארביטערען דאס לעבען זיך אליין, זייערע קרובים און זייערע דאקטוירים. פאר אזעלכע מענשען איז אפשר בעסער זיי זאלען ניט ליינען ארטיקלען און ניט הערען לעקטשורס וועגען קראנקהייטען.

אבער פאר די מעהרסטע מענשען איז יא נויטיג צו רעדען און צו שרייבען וועגען געזונט און קראנקהייטען, ווייל עס איז מעגליך אויסצולערנען די מעהרסטע מענשען זיי זאלען דערקאנען געוויסע סמנים פון קראנקהייטען, נאך איידער זיי דערפיהלען זיך קראנק, און דערמיט פארהיטען באצייטענס דאס א מילדע קראנקהייט זאל זיך ניט ענטוויקעלען אין אן ערנסטער.

פאר יעדען איינעם, וועמען אויפקלעהרונג וועגען געזונט קאן בריינגען שאדען (און עס זיינען דא אזעלכע) זיינען דא הונדערט אדער אפשר טויזענט מענשען וועמען עס קאן העלפען. דערפאר, דענק איך אז עס איז נוצליך און נויטיג צו רעדען און צו שרייבען וועגען קראנקהייטען, זייערע סמנים, ווי זיך אויסצוהיטען פון זיי און וואס צו טאן ווען מען ווערט שוין קראנק.

ד.ר. ב. דובאָווסקי

וואס פאר א קראנקהייט איז קאנסער ?

מיט העכער צוויי מיוזענט יאהר צוריק האט היפאָקראַט־טעס, וועלכער ווערט באַמחאכט אלס דער פאָטער פון דער מעדיצינישער פראָפּעסיע, באַשריבען אַ קראַנקהייט וועלכע הויבט אָן זיך ענטוויקלען אין איין טהייל קערפּער און פאַר-שפּרייט זיך צו די אנדערע טהיילען דורך פינגער-עהנליכע-אויסוואַקסען. אַזאָ סאַרט געוויקס אין קערפּער האָט, אין דער פאַנטאַזיע פון אַמאָליגע רופאים, אַנגענומען די פאַר-מע פון אַ ראַק — „קרעבס“ און מען האָט דאָרום דער דאָ-זיגער קראַנקהייט אַ נאָמען געגעבען קאנסער — אויף אי-דיש — ראַק.

פאַרשיידענע קינדישע מיינונגען געהן אַרום צווישען עולם וועגען קאנסער. אַ סך מענשען גלויבען דאָס אינ'ם קערפּער פונ'ם וואָס וואַקסט טאַקי אַ לעבעדיגער ראַק, און ער פּרעסט אויף דעם מענשען. דערפאַר פאַרלירט אַזאָ מענש אַ סך געוויכט. אנדערע גלויבען דאָס עס זיינען דאָ צוויי סאַרטען קאנסערס. אַ מענליכער און אַ ווייבליכער, און וועה-רענד די מענליכע קאנסערס זיינען גענוג שעדליך, זיינען עס אַבער די ווייבליכע קאנסערס וועלכע זיינען געפעהרליך, דאָס זיינען אַלץ פאַנטאַסטישע מעשיות.

אַ קאנסער איז אַן אַבנאָרמאַלע געוויקס פון קערפּער צע-לען. אין אַ טהייל פון קערפּער וואו די דאָזיגע צעלען באַ-לאַנגען ניט.

כדי דאָס בעסער צו פאַרשטעהן איז נויטיג צו וויסען ווי אַזוי און פון וואָס אונזער קערפּער איז צונויפגעשטעלט. פונקט ווי אַ געביידע באַשטעהט פון אַ סך ציגעל און שטיינער, צונויפגעשטעלט אין אַ געוויסער אָרדנונג און צו-נויפגעקלעפט מיט צעמענט, אַזוי באַשטעהט אונזער קער-פּער פון אַהן אַ צאָהל פאַרשיידענע צעלען, צונויפגעשטעלט

אין אַ געוויסער אָרדנונג, און איינגעטיילט אין פאַרשיידענע גלידער, אָדער קערפּער-טהיילען.

די דאָזיגע צעלען (אָדער די איינצעלנע ציגעל אין אונזער קערפּער-געביידע) אונטערשיידען זיך איינע פון די אנדערע לויט דעם טהייל קערפּער וואָס זיי פאַרמירען און לויט דער פונקציע, אָדער די אַרבייט, וואָס זיי האָבען צו טאָן.

די צעלען פון די ביינער זעהן אויס אַנדערש און טהוען זייער אַרבייט אַנדערש ווי די צעלען פון די נערווען, אָדער פון די מוסקולען, אָדער פונ'ם בלוט. יעדע צעלע איז אַזוי פאַרמירט דאָס זי זאל אַם בעסטען קאָנען דורכפיהרען די אַרבייט פאַר וועלכער זי איז געשאַפּען.

אָבער אלע צעלען, אַזוי לאַנג ווי זיי לעבען, האָבען צוויי אויפגאַבען פאַר זיך. ערשטענס האַרפּען זיי וואַקסען, זיך פאַרמעהרען און אויפהאַלטען די גאַנצקייט פונ'ם גליד פון וועלכען זיי זיינען אַ טהייל. און צווייטענס דאַרפּען זיי טאָן אַ געוויסע אַרבייט צו וועלכער זיי זיינען באַשטימט געוואָרען.

צום ביישפּיל: די נערוו-צעלען דאַרפּען פיהרען איינדריקע צו און פון מאַרץ. די מוסקול-צעלען דאַרפּען זיך איינצייען און אויסציהען, ווערען לענגער און קורצער און דערמיט באַוועגען די ביינער צו וועלכע זיי זיינען צוגעמישט. די צעלען פון די פאַרשיידענע אינערליכע דריזען דאַרפּען אויסאַרבייטען זייער באַשטימטע פליסיגקייט, די רויטע בלוט צעלען דאַרפּען אויפנעהמען און אָפּגעבען „אָקסידזשען“ (זייער שטאָף), א. א. ווייטער.

ווען אַ קינד הויבט נאָר וואָס אָן זיך ענטוויקלען אין דער געבעהר-מוטער פאַרשווענדען די צעלען פון קינד'ס קערפּער, זייער גאַנצע ענערגיע אויף וואַקסען און פאַרמעהרען זיך. פון איין קליינינקער, מיקראַסקאָפּישער צעלע, ווערט אין פאַרלוף פון עטליכע מאָנאַטען פאַרמירט אַ גאַנצער קערפּער, מיט אַ סך גלידער, וואָס באַשטעהט פון אונזעהליגע ביי-ליאָנען צעלען.

עטוואָס שפעטער, ווען דעם קינד'ס קערפּער איז שוין מעהר ענטוויקעלט, אָבער נאָך אַלץ אין דער געבעהר מומער, הויבען אָן די צעלען אויך צו דערפילען אַ טהייל פון זייע-רע פונקציעס.

דאָס האַרץ הויבט אָן קלאַפּען, דאָס הייסט די מוס-קול צעלען פון האַרץ הויבען אָן זיך איינציהען און אויס-ציהען. די בלוט צעלען הויבען אָן צירקולירען און אויפנעה-מען נאָהרונג און פרישע לופט פון דער מומער'ס בלוט. די צעלען פון מאַגען און פון די קישקעס הויבען אָן ווערען טהע-טיג.

ווען דאָס קינד ווערט געבוירען האָט שוין יעדע צעלע פון קערפּער איהר באַשטימטע אַרבייט צו טאָן. און אַ טהייל פון זייער ענערגיע גיבען שוין די צעלען אַוועק אויף אַר-בייטען. אָבער די גרעסטע טהייל פון זייער ענערגיע פאַר-שווענדען די צעלען נאָך אַלץ אויף וואַקסען און פאַרמע-ה-רען זיך. מעהר נייע צעלען ווערען געשאַפּען ווי עס ווערען צושטערט, און דער רעזולטאַט איז אז דאָס קינד האַלט אין וואַקסען, ווערט העכער, ברייטער, שווערער.

ווען מיר ווערען אַרום פינף און צוואַנציג יאָהר אַלט הע-רען מיר אויף צו וואַקסען. פון דאָן אָן ווערט נאָר אַ קליי-נער טהייל פון דער לעבענס ענערגיע וואָס די צעלען בא-זיצען פאַרווענדעט אויף צו פאַרריכטען די אָפּגענוצטע קער-פער טהיילען דורך שאַפּען נייע צעלען צו פאַרנעהמען דעם פלאַץ פון די וואָס ווערען צושטערט אָדער שטאַרבן אַלס אַ נאַטירליכע פּאָלגע פון זייער טהעטיגקייט. די גאַנצע אי-בעריגע ענערגיע זייערע פאַרנוצען די צעלען אויף צו טאָן זייער באַשטימטע אַרבייט.

פאַר וואָס די צעלען הערען אויף צו וואַקסען אַזוי גיך אָדער אַזוי פיעל ווי פריהער ווייסען מיר ניט. וואָס פאַר אַ קראַפט עס רעגולירט דעם וואַקס פון די פאַרשיידענע גלי-דער און דערלאָזט ניט, צום ביישפּיעל, אז איין פינגער זאָל וואַקסען אַ סך לענגער ווי די אַנדערע פינגער, אָדער אז

איין האנט אדער איין פוס זאל ניט וואקסען לענגער פון צווייטען ווייסען מיר אויך ניט.

א געוויסע קראפט, וואס מיר פארשטעהען נאך ניט, שיינט אויסצואיבען א שמרינגע קאנטראל איבער'ן וואוקס פון די קערפער צעלען, און גיט אכטונג דאס נאר אזוי פיעל נייע צעלען זאלען פארמירט ווערען וויפיעל עס ווערען צו-שטערט. דערמיט ווערט אויפגעהאלטען דער באלאנס, די גלייכגעוויכט צווישען די צעלען וואס שטעלען צונויף די איינצעלנע גלידער, און צווישען די איינצעלנע גלידער וואס שטעלען צונויף אונזער קערפער.

פאסירט אבער אמאל דאס געוויסע צעלען אין א טהייל פון קערפער פארלירען איבער זיך דעם קאנטראל, הויבען אן וואקסען „משוגענרווייז" און זיך פארמעהרען זעהר גיך. אזעלכע צעלען געהמען אן צוריק דעם פרימיטיווען כאראקטער וואס זיי האבען געהאט ווען דעם קינד'ס קערפער האט נאר וואס אנגעהויבען זיך ענטוויקלען. זיי פארלירען אין גאנצען די פעהיגקייט צו טאן א נוצליכע ארבייט אין קערפער. אלעס וואס זיי טוהען און עסען, וואקסען און פאר-מעהרען זיך. זיי וואקסען און פארמעהרען זיך אזוי גיך דאס זיי דרינגען אריין צווישען די צעלען פון קערפער טהייל אין וועלכען זיי געפינען זיך און צושטערען יענע געזונטע צעלען.

קאלאניעס אדער גרופעס פון אזעלכע פרימיטיווע צעלען רייסען זיך אפ פון דער אריגינעלער געוויקס, און ווערען דורך דעם לימפא-שטראם, (וואס צופיהרט שפייז צו די קער-פער צעלען) פארטראגען צו אנדערע טהיילען קערפער וואו זיי הויבען אן וואקסען, פארמעהרען זיך און פארמירען נייע קאלאניעס. אויף אזא אופן ווערט דער גאנצער קערפער דורכגעפרעסען פון די דאזיגע צעלען. די וויכטיגסטע ארגאנען פון קערפער ווערען באשעדיגט, און דער מענש שטארבט.

א געוויקס פון אזעלכע פרימיטיווע צעלען ווערט אנגע-רופען קאנסער.

טיומאָר און קאנסער

א סך מענשען וועלכע זיינען ניט גענוג באקאנט מיט ענגלישער טערמינאלאגיע (די באדייטונג פון ווערטער) פאר-ביימען אָפּט די צוויי ווערטער „טיומאָר“ און „קאנסער“. און דאָס פיהרט א סך מאל צו אומזיסטע עגמת נפש, זאָרג און שרעק.

דאָס וואָרט „טיומאָר“ מיינט א געשווילעכץ. יעדע פאר-גרעסערונג פון קערפער געוועבען איז א טיומאָר. א מכה איז א טיומאָר, א לאַקאַלע געשווילעכץ איז א טיומאָר, אַן אי-בערגעוויקס פון צעלען איז אויך א „טיומאָר“.

יעדע קאנסער-געוויקס איז דאָרום א טיומאָר. אָבער ווייט ניט יעדער טיומאָר איז א קאנסער. אפילו ווען די געוויקס באשטעהט פון צעלען וואָס וואַקסען אין א פּלאַץ וואו זיי דארפן זיך ניט געפינען זיינען זיי דערמיט אַליין נאך אלץ ניט קיין קאנסער צעלען.

פאַראַן א טיומאָר וואָס איז א געוויקס פון פעט-צעלען. „לייפּאַמאַס“ רופט מען זיי.

לייפּאַמאַס זיינען טיומאָרס אָדער געוויקס וואָס באשטעה-הען פון אַנזאַמלונג פון פעטס. די פעטס איז ניט צעשפרייט ווי אין א נאָרמאַלען צושטאַנד, נאָר איז אַנגעזאַמעלט אין בערגלאך ווי א ספּעציעלע געוויקס.

פון וואָנען זיי נעהמען זיך איז נאָך ניט פעסטגעשטעלט. מען דענקט דאָס זיי געהן איבער בירושה, ווייל מען באַגע-גענט זיי אָפּט אין עטליכע מיטגלידער פון דער זעלבער פא-מיליע ווי אויך ביי קינדער פון עלטערען וועלכע האָבען אויך אַזעלכע טיומאָרס. לייפּאַמאַס זיינען ניט געפּעהרליכע טיו-מאָרס, און זיי ווערען ניט פאַרוואַנדעלט אין קאנסערס. עס זיינען דאָ לייפּאַ-ניוראָמאַס-קאָמבינאַציעס פון פעטס און נער-ווען, אָדער פעטס און בלוט רעהרען טיומאָרס, וועלכע זיינען יאָ ערנסטע, אָבער די געוועהנליכע לייפּאַמאַס זיינען ניט שעד-ליך, סיידען זיי וואַקסען אין א טהייל פון קערפער וואו זיי

איבען אויס א צו גרויסען דרוק אויף די אַרומיגע בלוט רעהרען אָדער נערווען און שאַדען דערמיט דעם מענשענ'ס געזונט.

אין די פאלען וואו עס געפינט זיך איין לייפאָמא. דאָס הייסט איין פעט־טיומאָר, און ער איז אין אַזאָ פּלאַץ, הינטער דער הויט, וואו מען קאן לייכט צוקומען צו איהם קען מען איהם אויסשניידען. אָבער אין די פאלען וואו עס געפינט זיך אַ סך קליינע לייפאָמאס, ספּעציעל אויב זיי פאָר־אורזאָכען ניט קיין שמערצען און דיספּיגורירען ניט דעם קערפּער, האָט קיין זינען ניט זיי אויסצושניידען.

ווייל מען זי יאָ אויסשניידען איז אויך קיין געפאָהר ניט. ווייל די לייפאָמאס, אויב נאָר ניט צו גרויס זיינען געוועהנליך שאַרף אָפּגעטיילט פון די אַרומיגע קערפּער צעלען. און ווען מען שניידט אויף די הויט קאן מען זיי אַהן שוועריגקייטען אַרויסשילען פונ'ם קעפּסאַל אין וועלכען זיי געפינען זיך.

אַ צווייטער ביישפּיעל פון אַ טיומאָר וואָס איז ניט אַ קאַנסער איז דער פייברויד טיומאָר וואָס מען באַגעגענט אָפט אין אַ פרוי'ס געבעהר מוטער.

די געבעהר-מוטער באַשטעהט פון מוסקולען. ווען די מוסקולען ווערען צוצויגען אָדער באַשעדיגט און ווערען פאָר־ריכט פאַרמירט זיך אָפט צווישען די מוסקולען אַ צווייטע געוועב וואָס איז ניט אַזוי עלאַסטיש ווי די מוסקולען. בינ־דעם־געוועבען (פייבראָס טישו) רופט מען עס.

אָפּטמאָל פאַסירט אַז די דאָזיגע בינדעס־געוועבען הוי־בען אַן וואַקסען און ענטוויקלען זיך ביז זיי פאַרמירען אַ היבשע געוויקס אָדער אַ טיומאָר.

אַזאָ געוויקס, אַ פייברויד, איז ניט געפעהרליך אַן און פאָר זיך. דאָס הייסט, עס פראָדוצירט ניט קיינע געפעהר־ליכע שטאָפּען, אָדער גיפּטען וואָס באַשעדיגען דעם קער־פער, ווי עס איז דער פאל מיט אַ קאַנסער. עס איז נאָר שעד־ליך דערמיט, וואָס עס וואַקסט ווי אַ שישקע אין אַ בוים, אין דער געבעהר-מוטער און צושטערט די מוסקול געביי פון דער

געבעהר-מוטער. מאַנכע פון די פייברוידס וואַקסען אויך אזוי גרויס, אַז איינפאַך, צוליב זייער סייז, ווערען זיי שעד-ליך.

אַ פייברויד טיומאָר אין דער געבעהר-מוטער איז טאַקע אַ געוויקס אָבער קיין קאַנסער איז עס נישט.

די שעדליכקייט פון אַ פייברויד ווענדעט זיך אָן דער טייל פון דער געבעהר-מוטער וואו דער פייברויד וואַקסט. אויב ער וואַקסט הינטער דער שליים הויט פון דער געבעהר-מוטער, ביי אַ פרוי, וועלכע האַלט נאָר אין מענסטראַירען, פיהרט עס אָפּט צו אַ גרויסען בלוט-פאַרלוסט יעדען מאָנאַט, אַ בלוט פאַרלוסט וואָס קאָן זעהר פיעל שאַדען דער פרוי.

אויב דער פייברויד איז אין דעם מוסקול טייל פון דער געבעהר-מוטער און איז נישט גרויס, איז עס נישט שעדליך, און די פרוי קאָן זיך אומלעבען אַלע איהרע יאָהרען און גאָרנישט וויסען דערפון, אויסער ווען זי פאַרשוויינגערט.

קליינע פייברוידס, איבערהויפט ווען זיי זיינען עטליכע אין צאָהל, שטערען דער נאָרמאַלער פונקציע פון דער גע-בעהר-מוטער און ווען עס קומט די ענדערונגס-פעריאָדע ווע-רען זיי געוועהנליך איינגעשרומפּען און פאַרקלענערט.

עס זיינען אָבער אויך דאָ פייברוידס, וועלכע וואַקסען שנעל און ווערען צו גרויס. אין אַזעלכע פאַלען, אפילו ווען זיי שטערען נישט די נאָרמאַלע מענסטראַציע, דאַרף מען זיי אויך אויסשניידען.

די אָפּעראַציע איז אַ נישט געפעהרליכע. נאָר ווען די געבעהר-מוטער איז שטאַרק באַשעדיגט מוז מען זי אויסשניי-דען צוזאַמען מיט די פייברוידס.

ווען דאָס פאַסירט קאָן די פרוי מעהר נישט מענסטראַי-רען, ווייל נאָר די געבעהר-מוטער מענסטראַירט, און ווען די געבעהר-מוטער איז מעהר נישט, איז מענסטראַירען מעהר נישט מעגליך.

אָבער דאָס אויפהערען מענסטראַירען מיינט נאָך נישט דאָס אַנקומען פון דער ענדערונגס-פעריאָדע (מענאָפּאָז —

משיינדזש און לייף) אויב די פרוי איז נאך א יונגע, און איהר-
רע אַוואַרים בלייבן אונבאַריהרט, קומט נישט אָן די ענדער-
רונגס-פּעריאָדע, אַבוואַהל זי מענסטרוואַרט נישט מעהר.
אַ פייברויד איז דאָרום אַ טיומאָר. אַבער די צעלען פון
דעם טיומאָר דרינגען נישט אַרײַן צווישען די אַרומיגע צע-
לען פון דער געבעהר-מוטער. זיי פרעסען נישט אויף די אַרומי-
גע קערפער-צעלען און זיי זיינען דאָרום נישט קיין קאַנסערס.
אַ קאַנסער איז אַ געוויקס פון פרימיטיווע צעלען וואָס
פרעסען אויף די אַרומיגע קערפער-געוועבען אין וועלכע זיי
וואַקסען און זיי פאַרשפּרייטען זיך אויך צו אַנדערע טיילען
פון קערפער.
נישט אַלע טיומאָרס באַלאַנגען צו דער קאַנסער פאַמיליע.

געהט די קאַנסער - קראַנקהייט איבער בירושה ?

די פּראָגע צי קאַנסער איז אַ ירושה-קראַנקהייט אָדער
נישט איז אַ זעהר וויכטיגע פאַר אַלע וועמענס עלטערען אָדער
נאָענטע קרובים ליידען אָדער האָבען געליטען פון דער
דאָזיגער קראַנקהייט.

ליידער איז נישט מעגליך צו ענטפערען אויף דעם מיט אַ
פּאָזיטיווען יא, אָדער ניין.

אין אַ סך פּאלען באַגעגענט מען די קאַנסער קראַנקהייט
אין עטליכע מיטגלידער פון איין פאַמיליע. אין אַ היבשער
צאָל פּאלען טרעפט מען קאַנסער אין קינדער פון עלטערען
וועלכע האָבען אויך געליטען פון דער קראַנקהייט. אַבער
אין דער גרעסטער צאָל פון קאַנסער פּאלען קאָן מען נישט
געפינען קיין שום שפור פון ירושה.

די אַס-מעהרסטען אַנגענומענע מיינונג ביי היינטיגען
טאָג איז דאָרום דאָס קינדער פון קאַנסער-ליידענדע עלטער-
רען שיינען צו ירש'נען אַ נייגונג צו דער קראַנקהייט. אַבער
די דאָזיגע נייגונג אַליין איז נאָך נישט גענוג צו פאַראַרזאָכען
אַ קאַנסער געוויקס. עס מוזען אויך זיין די אַורזאָכען (ריי-
צונגען אָדער כעמישע סטימולאַנטען וואָס פאַרוואַנדלען

נארמאלע קערפער-צעלען אין קאנסער צעלען. אויב די דאָ-
זיגע באַדינגונגען עקזיסטירען וועלען קינדער פון קאנסער
ליידענדע עלטערען גיכער קריגען די קראנקהייט ווי קינדער
פון עלטערען וועלכע זיינען ריין פון קאנסער.

מיט אַנדערע ווערטער, די וועלכע ירש'נען אַ נייגונג
צו דער קראנקהייט קאנען ווייניגער אויסהאלטען די קאנסער-
שאַפענדע אורזאכען ווי די וועלכע האָבען אזא נייגונג ניט
גע'ירש'נט.

אַבער אזוי ווי די קראנקהייט געהט ניט איכער דירעקט
בירושא, און וועגען די אורזאכען וואָס רופען אַרויס די
קראנקהייט איז מען נאָך אויך ניט זיכער, דאַרף מען זיך ניט
שרעקען טאָמער האָט מען די קראנקהייט גע'ירש'נט. קינדער
פון קאנסער ליידענדע עלטערען קאנען פונקט אזוי גוט אויס-
לעבען זייערע יאָהרען אַהן קאנסער ווי די וועמענס עלטער-
רען האָבען ניט געליטען פון קאנסער. ניט מעהר אַזעלכע
קינדער דאַרפען זיין מעהר פאַרזיכטיג און ניט פאַרנאָכלע-
סיגען די סמנים פון קאנסער, ווי איך וועל דאָס דערקלעה-
רען אין אַ שפּעטערען קאפיטעל.

איז קאנסער אַן אנשטעקענדע קראנקהייט ?

אַן אנשטעקענדע קראנקהייט מיינט אזא חולאת מיט
וועלכער מען קאן זיך אַננעהמען ווען מען קומט אין נאָהענ-
טער באַריהרונג מיט אַ מענשען וועלכער איז שוין קראַנק.
אנשטעקענדע קראנקהייטען ווערען פאַראורזאכט פון
מיקראָבען. מען געהט זיך אַן מיט זיי ווען די מיקראָבען
געהען איכער דירעקט פונ'ם קראַנקען צו דעם מענשען וועל-
כער איז נאָך ניט קראַנק, ווי עס איז דער פאַל מיט טויבערקו-
לאַזים. סקאַרלעט פיכער, לונגען ענטצינדונג, און עהנליכע
קראנקהייטען; אַדער ווען די מיקראָבען געהן איכער אונדז-
רעקט, דורך אַ פאַרמיטלער, ווי עס איז דער פאַל מיט מאַ-
לעריע. אין מאלעריע קאן מען זיך ניט אַננעהמען דירעקט
פונ'ם קראַנקען אַליין. די חולאת פאַרשפּרייט זיך דערמיט

וואס א מאַסקיטאָ טראַגט איבער די מיקראָבען פון קראַנקען צום געזונטען מענשען.

אויף ווי ווייט מען ווייסט ביי היינטיגען טאָג, ווי ווייט מען האָט אויסגעפינען פון די אונזעהליגע עקספּערימענטען וואָס מען האָט שוין געמאַכט מיט פאַרשיידענע קאַנסערס אין פאַרשיידענע חיות, ווערט די קראַנקהייט ניט פאַראַור-זאָכט פון מיקראָבען און קאָן דאַרום ניט איבערגעהן פון מענש צו מענשען.

אין עקספּערימענטען וואָס מען מאַכט אויף חיות ווען מען וויל איבערטראַגען אַ קאַנסער געוויקס פון איין חיה צו דער אַנדערער, מוז מען אַ קלייניקע טייל פונ'ם געוויקס איינפלאַנצען אינ'ם קערפּער פון דער געזונטער חיה. די קאַנ-סער צעלען הויבען האָן אָן וואַקסען און פאַרמעהרען זיך אינ'ם קערפּער פון דער חיה אין וועלכער מען האָט זיי אַריי-בערגעטראַגען.

פון דעם אַלעמען שיינט עס צו זיין זיכער דאָס עס איז קיין שום געפאָהר צו קומען אין נאָהענטער באַריהרונג מיט אַ קאַנסער קראַנקען. מען קאָן זיך מיט זיין חולאת ניט אָנ-שמעקען.

א בינמאל קאַנסער ציפּערען.

ווי ווייט פאַרשפּרייט איז די קאַנסער קראַנקהייט? ווי-פיעל מענשען ליידען פון דער דאָזיגער קראַנקהייט?

קאַנסער פאַרנעהמט איצט אַ זעהר בכבוד'ן פּלאַץ אינ'ם צעמאל פון ערנסטע און לעבענס געפעהרליכע קראַנקהייטען. גענוי וויפיעל מענשען עס ליידען פון דער קראַנקהייט ווייסט מען ניט, נאָר אַרום הונדערט מיט פופציג טויזענד מענשען שטאַרבן יעדען יאָהר אין אַמעריקא פון קאַנסער. מען רעכנט אַז די צאָל קראַנקע פון קאַנסער איז אַרום 4 מאל אַזוי פיעל. דאָס מיינט אַז אַרום זעקס הונדערט טויזענד מענשען אין אונזער לאַנד זיינען קאַנסער-קראַנקע, און די מעהרסטע פון זיי זיינען צווישען פינף און פערציג און אכטציג יאָהר אַלט.

די קאנסער קראנקהייט עקזיסמירט אין אלע לענדער, עס ליידען פון איהר מענשען פון יעדער ראסע, אין יעדען ווייניג קעלע פון אונזער ערד. זי האט קיין אבשיי פאר רייכע און קיין רחמנות אויף די ארעמע.

עס ליידען פון איהר מענער, פרויען און קינדער. מע-נער ליידען מעהר פון קאנסער אין זייער פארדייאונגס סיסטעם, (מאגן און קישקעס), פרויען ליידען מעהר פון קאנסער אין די בריסט, און געבעהר-מוטער, קינדער ליידען מעהר-סטענס פון א ספעציעלען סארט קאנסער וואס מען רופט „סארקאמא“, וועגען וועלכען איך וועל שרייבען אין א ספעציעלען קאפיטעל.

די קראנקהייט קאן אנגרייפען יעדע טייל פון קערפער. די הויט, דאס מויל, די צונג, די לונגען, די בריסט, דעם מאגן, די קישקעס, די דריזען און די געשלעכטס ארגאנען. קיין איין טייל פון קערפער איז נישט באשיצט געגען דער דאזיגער מערדערליכער חולאת. און ווען זי הויבט זיך אן אין איין קערפער טייל פארשפרייט זי זיך אויך צו די אנדערע טיילען. דורך די לימפא קאנאלען אדער דורכ'ן בלוט (אין פאל פון סארקאמא) ווערען נעסטען פון קאנסער צעלען פארטראגען צו אנדערע קערפער טיילען, און ווען דאס פאסירט איז שוין כמעט אונמעגליך צו ראטעווען דאס לעבען פון קראנקען.

אורזאכען פון קאנסער.

ווי איך האב שוין פריהער דערקלעהרט, באשטעהט די קראנקהייט אין דעם וואס געוויסע צעלען אין א טייל פון קערפער פארלירען דעם קאנטראל איבער זיך. זיי קעהרען זיך אום צוריק צו זייער אמאליגען פרימיטיווען צושטאנד, ווי זיי זיינען געווען ווען דעם מענשענ'ס קערפער האט זיך געהאלטען אין פארמירען אין דער געבעהר-מוטער. זיי הויבען אן וואקסען „משוגענער ווייז“, פארמעהרען זיך זעהר גיך, דרינגען אריין צווישען די קערפער צעלען פון די ארומיגע

געוועבען, פרעסען אויף און צושטערען די קערפער מייל אין וועלכער זיי געפינען זיך.

אבער פארוואס דאס זאל פאסירען, פארוואס די דאזיגע צעלען זאלען פלוצלינג אנהויבען וואקסען און זיך פארוואנדלען אין פרימיטיווע אדער קאנסער צעלען, דאס ווייסט מען נישט אויף זיכער. מיט אנדערע ווערטער, טראץ אלע אונטער-זוכונגען און עקספערימענטען וואס מען האט ביז איצט גע-מאכט איז נאך אלץ נישט געלונגען אויסצוגעפינען די אורזא-כע וואס פארוואנדעלט נארמאלע קערפער צעלען אין קאנ-סער צעלען.

עס זיינען דא פארשיידענע טהעאריעס, מיינונגען וועגען די אורזאכען פון קאנסער, און עס זיינען דא פאקטען צו בא-שטעטיגען די דאזיגע מיינונגען. אבער קיין איינע פון די דער-קלעהרונגען האלט נישט אויס אין אלע פאלען.

איינ מיינונג איז דאס א גרופע פרימיטיווע צעלען זיי-נען געבליבען פארשטעקט ערגעץ וואו אין קערפער נאך פון דער צייט ווען דאס קינד האט זיך געהאלטען אין ענטוויק-לען אין דער געבעהר-מוטער. אזוי לאנג ווי דער מענטש איז געווען יונג און געזונט זיינען די דאזיגע צעלען געווען נישט אקטיוו. נאר אויף דער עלטער, צוליב אורזאכען וואס מיר ווייסען נאך נישט, האבען די דאזיגע צעלען זיך אויסגעטשור-כעט פון זייער שלאף. די קראפט, וואס האט זיי געהאלטען אין צוים האט פארלוירען איהר ווירקונג אויף זיי, און זיי האבען אנגעהויבען וואקסען און פארמעהרען זיך.

א צווייטע מיינונג, וואס האט א גרויסע צאל אנהיינגער צווישען דאקטוירים איז דאס א לאנג-דויערענדע רייצונג, א פיזישע אדער א כעמישע, קאן פארוואנדלען אפילו געוועהנ-ליכע, נארמאלע קערפער צעלען אין קאנסער צעלען.

די רייצונג קאן זיין אן אויסערליכע, עטוואס מיט וואס דער מענטש קומט אין באריהרונג אדער אן אינערליכע וואס ווערט געשאפען אינ'ם קערפער אלס א רעזולטאט פון נישט גענוג גוט פארדייעטע שפיזען, אדער פון עטוואס וואס מיר נעהמען אריין אין אונזער קערפער צוזאמען מיט אונ-

זער עסען און טרינקען, אדער פון געוויסע כעמישע ביי-פרא-דוקטען וואס ווערען געשאפען בעת אונזער שפיז ווערט מע-טאבליזירט — פארנוצט אין קערפער.

אינ'ם שטודירען דעם כאראקטער פון קאנסער צעלען, האט מען אנגעזאמעלט א גרויסע צאל פאקטען וואס צייגען דאס א כראנישע רייזונג פון געוויסע הויט-צעלען קאן מיט דער צייט פאראורזאכען א קאנסער געוויקס. קאנסער פון דער ליפ, צונג און מויל ווערט דערקלעהרט אויף אזא אופן. עס איז אויך באוויזען געווארען, דורך עקספערימענטען אויף חיות, דאס געוויסע כעמישע שטאפען ווען איינגעשפריצט אין קערפער פון די חיות פאראורזאכען א קאנסער געוויקס. דאס זאל באשטעטיגען די מיינונג דאס געוויסע כעמישע שטאפען וואס פארמירען זיך אין קערפער זיינען פאראנט-ווארטליך פאר א סך קאנסער פאלען.

עס איז אבער א פאקט דאס אלע מיינונגען (און עס זיי-נען דא א סך) וועגען דעם ווי אזוי און פארוואס קאנסער ענטוויקעלט זיך אין קערפער פון א מענשען, זיינען נאך מעאריעס געשטיצט אויף א באשריינקטער צאל פאקטען וואס קאנען זיין גילטיג אין עטליכע אבער ניט אין אלע פאלען פון קאנסער.

מיר זיינען דארום געצוואונגען אנצונעהמען די מיינונג דאס עס איז מעגליך אז קאנסער האט ניט איינע נאך א סך אורזאכען. און פארשיידענע אורזאכען רופען ארויס פארשיי-דענע פארמען פון קאנסער.

די לאגישסטע מעאריע שיינט צו זיין דאס אינ'ם קער-פער הערשט א געוויסע הארמאניע צווישען פארשיידענע צעלען אין יעדער טייל פון קערפער און צווישען די פארשיי-דענע גלידער וואס שמעלען צונויף דעם קערפער. די קראפט וואס איכט אויס דעם דאזיגען קאנטראל אויפ'ן וואוקס און פארמעהרען זיך פון די צעלען, ווי אויך אויף זייער טהע-טיגקייט האבען מיר נאך ביז היינטיגען טאג ניט אויסגע-פינען.

צי די דאזיגע הארמאניע ווערט אויפגעהאלטען פון די

ווייטאמינען אין אונזער שפייו, אדער פון די הארמאנען וואס אונזערע דריזען שאפען אדער פון עטוואס אנדערש וואס דער קערפער ציהט ארויס פון אונזער שפייו ווייסט מען נישט. איין זאך שיינט צו זיין זיכער, אין די פאלען וואו קאנסער ענט-וויקעלט זיך האט עטוואס פאסירט וואס האט צושטערט די... הארמאני, אדער געבראכען די קאנטראל איבער'ן וואוקס פון די קערפער-צעלען, און די דאזיגע צעלען, באפרייט פון קאנטראל איבער זיך האבען זיך צואוואקסען און זיך צוריק גע-קעהרט צו זייער פרימיטיווען, "עמבריאנישען" צושטאנד.

פארשיידענע סארטען קאנסערס

קאנסער איז נישט איין קראנקהייט נאר א גרופע קראנק-הייטען. די פארשיידענע מיטגלידער פון דער גרופע, וואס געהן אלע אונטערן נאמען קאנסער אונטערשיידען זיך זעהר פיעל איינע פון די אנדערע.

עס זיינען דא קאנסערס וועלכע ענטוויקלען זיך זעהר לאנגזאם, זיינען זעהר סענסיטיוו צו רעדיום שטראהלען און אויב זיי געפינען זיך אין א טייל פון קערפער וואו מען קאן זיי גרינג און גיך דערקאנען, (ווי אויף דער הויט, צום ביי-שפיעל) קאן מען די קאנסער צעלען גרינג צושטערען און דעם מענשען קורירען. עס זיינען אויך דא אנדערע קאנסער געוויקסען וועלכע ענטוויקלען זעהר גיך, די צעלען זיינען נישט סענסיטיוו צו ראדיום שטראהלען, דאס הייסט אז די אנטוויקלונג פון ראדיום העלפט נישט אין אזעלכע קאנסערס. און עס איז נישט מעגליך אפצושטעלען דעם שאדען און דאס פארשפרייטען זיך פון אזא געוויקס.

פארהאן א גאנצע גרופע פון די קאנסער קראנקהייטען וואס ווערט באצייכענט מיט'ן נאמען: "סארקאמאס". גע-וועהנליכע קאנסערס, אדער "קארסינאמאס", גרייפען אן מעהרסטענס עלטערע מענשען, מענשען אין פינפטען צעהנד-ליג יאהר פון זייער לעבען אדער עלטער. זיי פארמירען זיך

מעהרסטענס אין א דריזען-עהנליכע פארמע (אדענא-קארסי-נאמא) און זיי פארשפרייטען זיך פון איין טייל קערפער צום אנדערען דורך די לימפא-קאנאלען (די קאנאלען דורך וועלכע די שפיין ווערט געפיהרט פונ'ם בלוט צו די איינצעלנע צע-לען).

„סארקאמאס“ גרייפען אן מענשען אין יעדען עלטער, קליינע קינדער, יונגע דערוואקסענע מענשען און זקנים. די סארקאמא-געוויקס קאן זיך ענטוויקלען אין יעדער טייל פון קערפער, אין די ביינער, אין די מוסקולען, די הויט, די לונגען, דעם מארך, און זיי פארשפרייטען זיך דורכ'ן בלוט. דאס הייסט צעלען פון דער געוויקס רייסען זיך אפ, דרינגען אריין אין די בלוט רעהרען און ווערען, פונ'ם בלוט שטראם פאר-טראגען וואוהין דאס בלוט דערגרייכט נאר.

צווישען די סארקאמאס זיינען דא מילדע געוויקסען. זיי ענטוויקלען זיך לאנגזאם, בלייבען א לאנגע צייט אויף איין פלאץ אין קערפער און ווערען זעהר גרינג באוויקסט פון רע-דיום שטראהלען און עס זיינען ערנסטע געוויקסען, ספעציעל די ביין קראנקהייט (אסטיא סארקאמא) וועלכע גרייפט אן מעהרסטענס יונגע קינדער און איז אזוי געפעהרליך דאס זי מיימט איהרע קרבנות אין א פארעלטניסמעסיג קורצער צייט. אפילו עקס-דעי אדער רעדיום שטראהלען האבען קיין ווירקונג ניט אויף זיי.

עס איז דארום ניט מעגליך אנצונעהמען דאס אזעלכע פארשיידענע קאנסער געוויקסען וואס אונטערשיידען זיך אזוי שטארק אין זייער געביי, זייער וואוקס, זייער פאר-שפרייטען זיך און זייער שאדען פאר'ן קערפער זאלען אלע קומען פון איין אורזאכע. און עס איז דערפאר ניט מעגליך צו דערווארמען אז מען וועט אמאל אויסגעפינען די איינציג גע-אורזאכע פאר קאנסער. גיכער קאן מען גלויבען דאס פאר-שיידענע קאנסער, אויף פארשיידענע טיילען פון קערפער ווערען פאראורזאכט פון פארשיידענע זאכען וואס סטימולירען דעם וואוקס פון די קאנסער צעלען.

די סמנים פון קאנסער

וואָס זיינען די סמנים לויט וועלכע מען זאָל דערקאַנען די קאנסער קראַנקהייט ?

ליידער זיינען די אָנהויב סמנים פון קאנסער ניט גענוג דייטליכע מען זאָל זיי גלייך דערקאַנען, אָדער דערקאַנען פריהצייטיג גענוג איידער די קראַנקהייט האָט פאַראורזאכט פיעל שאַדען. די ענטוויקלונג פון דער קראַנקהייט איז אין די מעהרסטע פאַלען אַזאָ גיכע דאָס ווען דער פאַציענט וואַרט צו לאַנג, ביז די דייגענאַזיס איז אַ פאַזיטיווע, איז דער קאַנ-סער שוין צופיעל איינגעפרעסען אין קערפער.

ווען אַ קאנסער געוויקס איז אויף אַן אויסערליכע טייל פון קערפער, ווי אויף דער הויט, די ליפּען, די צונג אָדער דאָס פנים איז עס ניט שווער צו דערקאַנען באַלד אין אָנהויב, און מען קאָן אויך, אַהן פיעל שוועריגקייטען, פעסטשטעלען דעם אמת'ן כאַראַקטער פון דער קראַנקהייט. צום ביישפּיעל, אַ קאנסער אויף דער הויט פון פנים הויכט זיך אָן, אין די מעהרסטע פאַלען, ווי אַ קליינער וואונד, אַ באַדעווקע, אָדער אַ „פּימפּעל" אויף אַ באַק, אונטערן אויג, אויף אַן אויגען-דעקעל, אָדער אויף אַ ליפּ. די באַדעווקע אָדער דאָס „פּימ-פעל" בלומעט אָפּט. די וואונד פאַרהיילט זיך ניט. מאַנאטען און אמאל יאָהרען געהן פאַרבלייבן פון דער קליינער געוויקס ווערט אַ גרעסערע וואונד וואָס פאַרשפּרייט זיך און ווערט וואָס אמאל גרעסער.

אזא קאנסער וואַקסט זעהר לאַנגזאַם און מען קאָן צו איהם זעהר גרינג צוקומען צו קורירען.

אנדערש איז אָבער דער פאַל ווען די געוויקס הויכט זיך אַן ענטוויקלען אין די אינערליכע טיילען פון קערפער, ווי אין מאַגען, אין די קישקעס, אין דער פענקריעז דריזע, אין דער געבעהר-מוטער, אין דער פראַסטאַמע, אין די ביינער אָדער אין איינעם פון די אנדערע אינערליכע אָרגאַנען. אויסערליך קאָן מען, אין אָנהויב, אזא געוויקס ניט זעהן, און די שמער-צען אָדער אַנדערע דייטליכע סמנים וואָס אזא געוויקס פאַר-

אורזאכט קומען ליידער נישט פריה גענוג צו קאנען ווארנען דעם מענשען געגען דער געפאהר אין וועלכער ער געפינט זיך.

עס איז דארום בעסער צו זיין צופיעל פארויכטיג איידער נישט פארויכטיג גענוג. עס איז בעסער צו פארדעכטיגען קאנ-סער און א גענויע אונטערזוכונג זאל צייגען אז דאס איז נישט קיין קאנסער, איידער ווארמען צו לאנג און אויסגעפינען דאס עס איז יא קאנסער.

דערפאר איז וויכטיג צו געדענקען אז יעדער מיטעל-יעהריגער אדער עלטערער מענש קאן אנגעגריפען ווערען פון דער קאנסער קראנקהייט. אום זיך באווארענען געגען א מעגליכער פארנאכלעסונג פון אזא צושטאנד דארף אזא מענש זיך ווענדען צו א קאמפעטענטען דאקטאר אזוי גיך ווי ער כא-מערקט אין זיך סמנים פון וועלכער עס איז קראנקהייט.

יעדער מיטעל יעהריגער מענש, וועלכער האט פריהער נישט געליטען פון א מאגען אונגלעכונג, און ער הויבט פלוצ-לינג אן יא צו ליידען דערפון, דארף זיך באלד ווענדען צו א דאקטאר פאר א גרינדלעכער אונטערזוכונג. ספעציעל מוז ער עס טאן, אויב ער הויבט אויך אן ליידען פון בלוט ארעמקייט, און ער פארלירט געוויכט.

יעדע דערוואקסענע פרוי וועלכע בלומעט צופיעל אדער צו אפט, ספעציעל, אין דער צייט פון איהר ענדערונגס פער-יאדע, און יעדע פרוי וועלכע הויבט אן בלומען נאכדעם ווי זי האט שוין אויפגעהערט מענסטרואירען, מוז זיך גלייך לא-זען אונטערזוכען ביי א דאקטאר.

יעדער מיטעל יעהריגער אדער עלטערער מענש, וועלכער ליידט פון א פארגרעסערטע פראסטאמע (ווען ער האט שווע-ריגקייטען ביים לאזען וואסער, אדער ער מוז אויפשטעהן עט-ליכע מאל ביינאכט צו לאזען וואסער) דארף זיך לאזען אונ-טערזוכען ביי א דאקטאר. אין די מעהרסטע פאלען איז די פארגרעסערונג פון דער פראסטאמע א געוועהנליכע (א פאר-הארמונג), אין א געוויסער צאל פאלען ענטוויקלט זיך אויך א קאנסער געוויקס אין דער דריזע.

יעדע פרוי, יונג, מיטעל יעהריג אָדער עלטערע, וועלכע באמערקט א גוליע אין איינער פון איהרע בריסט מוז גלייך צוגעהן צו א דאקטאר און אויסגעפינען וואָס די גוליע באדייט. אויב נויטיג דארף מען די גוליע אליין (ניט די ברוסט) אויס-שניידען און אונטערזוכען. אַרום פופצעהן טויזענד פרויען שטארבען יעדען יאָהר אין אמעריקא פון בריסט קאנסער. ארום צעהן טויזענד פון זיי וואָלט מען געקאָנט ראטעווען ווען מען אפערירט זיי באצייטענס.

יעדער מענש וועלכער באמערקט דאָס ער ווערט געל, (געלזוכט) ספעציעל אויב דאָס ענטוויקעלט זיך לאנגזאם און אַהן שמערצען, מוז זיך, אזוי גיך ווי מעגליך ווענדען צו א דאקטאר. קאנסער אין דער פענקריעז דרייע ענטוויקעלט זיך מיט אַזעלכע סמנים.

יעדער מיטעל יעהריגער מענש, אפילו ווען ער פיהלט זיך גאַנץ געזונט, דארף פון צייט צו צייט זיך לאָזען אונטער-זוכען ביי א דאקטאר. דורך אַזעלכע פעריאָדישע אונטערזוכונ-גען קאָן מען האַפען צו ענטדעקען קאנסער קראנקהייטען אין אָנהויב פון זייער ענטוויקלונג, ווען די פאציענטען אליין פיה-לען נאָך ניט די קראנקהייט, און ווען עס איז נאָך מעגליך צו ראטעווען דאָס לעבען פון קראנקען.

די מורא צו וויסען דעם אמת

א סך מענשען, ווען זיי פארדעכטיגען דאָס זיי ליידען פון קאנסער, האָבען מורא צו געהן צו א דאקטאר. זיי שרע-קען זיך טאָמער וועט דער דאקטאר אויסגעפינען דאָס זיי ליידען טאָקי פון אזא געוויקס, און קאנסער, ווייסען זיי איז ניט קורירבאר. דערפאר ווילען זיי ניט אויסגעפינען אויף זי-כער צו זיי האָבען טאָקי די קראנקהייט אָדער ניט. זיי האַל-טען זיך אָן דער קינדישער מיינונג דאָס אזוי לאנג ווי זיי וויי-סען ניט אויף זיכער וועט עס זיי ניט שאדען.

אז דאָס איז אַ קינדעריי איז זעהר גרינג צו פארשטעהן. דאָס ניט וועלען וויסען דעם אמת וועט ניט אפשטעלען די

ענטוויקלונג פונ'ם קאנסער אויב עס איז טאקי אזא געוויקס, און וואס לענגער מען ווארט אלץ קלענער ווערען די אויס- זיכטען צו קאנען ראטעווען דאס לעבען פון קראנקען.

פון דער אנדערער זייט, אויב דאס איז ניט א קאנסער געוויקס און מען געפינט אויס באצייטענס פארשפארט דער פאציענט צו לעבען אין אומזיסטע טויט שרעק. א סך פא- ציענטען פאראומערען זיך די טעג מיט די יאחרען און ווערען קראנק פון אנגסט און זארג, גלויבענדיג דאס זיי ליידען פון א קאנסער, וואס זיי האבען ניט.

אלס ביישפיעל ווי אזוי די אומזיסטע מורא פאר קאנסער קאן אנטאן א סך שאדען, קאן דינען פאלגענדער פאקט פון מיון אייגענער ערפאחרונג.

מיט אכט יאָהר צוריק האָט א פרוי, עטליכע און דרייסיג יאָהר אלט, באמערקט א גוליע אין איהר לינקער ברוסט. זי איז באלד געקומען צום שלום אז זי האט קאנסער, און איז שיער ניט געשמארבען פון שרעק. וואכען נאכאנאנד האָט זי זיך ארומגעטראָגען מיט'ן געדאנק דאָס זי האָט קאנסער. זי האָט אויפגעהערט צו עסען, ניט געקאנט שלאָפען און האָט אָנגעהויבען פארלירען געוויכט.

א כירורג וועלכער האָט זי נאכהער אונטערזוכט האָט איינגעשטימט דאָס עס זעהט אויס ווי א קאנסער געוויקס, ער האָט אָבער צוגעזאָגט דאָס ער וועט אויסשניידען די גע- וויקס אליין, לאָזען דאָס גלייך אונטערזוכען אויב עס וועט זיך ארויסווייזען אז דאָס איז טאקי א קאנסער וועט ער באלד מאַכען א ראדיקאלע אפּעראציע און אויסשניידען די ברוסט. אָבער אויב עס וועט זיך ארויסווייזען אז דאָס איז ניט קיין קאנסער, וועט די פרוי מעהר ווי די גוליע אליין ניט פאר- לירען.

אין האספיטאל, וואו די אפּעראציע איז געמאכט געוואָר- רען איז דער „פּאַטאָלאָג" (דער דאָקטאָר וועלכער האָט גע- דארפט אונטערזוכען די אויסגעשניטענע גוליע) געווען זי- כער אז דאָס איז א קאנסער געוויקס. אָבער ווען ער האָט אויפגעשניטען דעם ארויסגענומענעם טימאָר האָט זיך ארויס-

געוויזען, אז דאָס איז געווען א „סיסט“ (אן אנזאמלונג פון פלי-סיגקייט), ניט קיין קאנסער. די ברוסט איז ניט אויסגעשניטען געוואָרען, דער „טיומאָר“ איז צוריק ניט אָנגעוואַקסען. די פרוי האָט אומזיסט זיך געשראַקען, און וואָלט זי ניט געווען אפּערירט געוואָרען וואָלט זי אפשר מיט דער צייט גע-שטאַרבּען פון שרעק פאר קאנסער. די צייטליכע אַפּעראציע האָט דער פרוי איינגעשפּאַרט א סך ליידען.

איך מוז אָבער דערצעהלען וועגען א צווייטען פאל, אויך פון מיין אייגענער ערפּאהרונג, וואָס וועט אילוסטרירען די געפּאהר פון ווארטען צו לאנג.

א פרוי אין די פּופציגער יאָהרען האָט באמערקט א קליי-נינקע גולקעלע אין איהר לינקער ברוסט. מאָנאטען לאנג האט זי דאָס געזעהן, באַטאַפּט, געפּיהלט ווי הארט עס איז. אָבער אזוי ווי עס האָט ניט ווייח געמאַן האָט זי זיך געמאַכט ניט וויסענדיג דערפון.

ערשט מיט א צייט שפּעטער האָט איהר מאַן זיך דער-וואוסט דערפון און איהר געבראַכט צום דאָקטאָר.

דער דאָקטאָר האָט איהר אונטערזוכט און דערקלעהרט דאָס יעדע גולע אין א ברוסט פון א מיטעל יעהריגער פרוי דאַרף ארויסגענומען און אונטערזוכט ווערען. אויב עס איז ניט קיין קאנסער איז דער שאַדען צו דער ברוסט ניט קיין גרויסער, אויב יא, און אויב אפּערירט באציטענס קאן עס ראטעווען איהר לעבען.

ווען די פרוי איז אפּערירט געוואָרען האָט זיך ארויסגע-צייגט אז דאָס קליינינקע גולקעלע האָט אין זיך געהאט קאנ-סער צעלען.

א ראדיקאַלע אַפּעראציע און א סך עקס-רעי באהאנדלונג-גען זיינען אנגעווענדעט געוואָרען אין דעם פאל. אין א יאָהר אַרום האָט מען געמוזט מאכען א צווייטע אַפּעראציע און נוצען נאך מעהר עקס-רעי באהאנדלונגען. אָבער די פרוי איז געשטאַרבּען פון קאנסער.

קאנסער אין א ברוסט, ווען נאך קליין און איידער עס האָט זיך פאַרשפּרייט צו די לימפּה-דריזען אין אַקסעל, אָדער

צו די לונגען, קאן מען קורירען דורך אויסשניידען די ברוסט.
דאס זעלבע קאן מען זאגען וועגען קאנסער אין מאגען,
אדער וועגען קאנסער אין דער געבעהר-מוטער. באלד אין
אנהויב פון זיין ענטוויקלונג קאן דער קאנסער קורירט ווע-
רען דורך אויסשניידען די געבעהר-מוטער. אויב די אפעראציע
ווערט געמאכט באצייטענס, איידער די קראנקהייט האט זיך
צואוואקסען און פארשפרייט, קאן דער מענטש געראטעוועט
ווערען.

אויך דער פונקט קאן אילוסטרירט ווערען מיט א ביי-
שפיעל וואס איז מיר פערזענליך באקאנט.

א פרוי, צוויי און פופציג יאָהר אלט, איז געקומען זיך
באקלאָגען אויף אַפטעס און אונרעגעלמעסיגעס בלוטען, אַכט-
וואַהל זי האָט אויפגעהערט מענסטרואירען שוין מיט זיבען
יאָהר צוריק.

אין האַספיטאַל וואוהין איך האָב די פרוי געשיקט האָט
מען געמאכט א „קורעטאזש“ (אן אויסשאַבונג פון דער שליים
הויט אין דער געבעהר-מוטער). קיין אנדער זאך ווי א כראַ-
נישע ענטזינדונג אין דער שליים הויט האָט קיינער ניט פאַר-
דעכטיגט. אָבער ווען דער „פאַטאָלאָג“ פון האַספיטאַל האָט
אונטערזוכט די אויסגעשאַבענע שליים הויט האָט ער אין
איהר געפונען קאנסער צעלען.

די פרוי איז דאָן אַפערירט געוואָרען. איהר געבעהר-מו-
טער האָט מען אויסגעשניטען און גרינדלעך אונטערגעזוכט.
אָבער קיין שפור פון קאנסער האָט מען אין איהר ניט געפון.
נען. עס איז געווען נאָר אַן אנהויב פון קאנסער וואָס איז
דערווייל געווען נאָר אין דער שליים הויט, און גליקליכער-
ווייזע האָט מען דאָס אויסגעפינען און באזייטיגט באצייטענס,
איידער עס האָט זיך פארשפרייט צו דער געבעהר-מוטער.

דאָס אונגליק אין די מעהרסטע פאַלען פון קאנסער איז
וואָס די קראַנקע וואַרטען צו לאַנג איידער זיי געהן צום דאָק-
טאָר. זיי זיינען ניט וויליג דורכצומאכען אַלע נויטיגע אונ-
טערזוכונגען כדי פעסטצושטעלען דעם באַראַקטער פון זייערע
קראַנקהייט. און אפילו נאָכדעם ווי דער פאַרדאָכט פון קאנ-

סער איז שוין א שטארקער ווארטען זיי אויך צו לאנג איידער זיי באשליסען צו לאזען זיך אָפּערירען. און אין דער גרעסטער צאל פאלען ווען זיי זיינען שוין יא וויליג האט די קראנקהייט זיך שוין צופיעל פארשפרייט אין קערפער און די לאגע איז אן האפנונגסלאזע.

קאן מען זיך אויסהיטען פון קאנסער ?

כדי צו קאנען זיך אויסהיטען פון א קראנקהייט דארף מען פריהער וויסען פון וואס די קראנקהייט ווערט פאראור-זאכט, און וועלכע באדינגונג עס העלפען צוגרייטען דעם בא-דען אין קערפער. אזוי דאס די באטרעפענדע קראנקהייט זאל זיך קאנען ענטוויקלען.

א לאנגע צייט האט מען געגלויבט דאס אין די פאלען אין וועלכע קראנקהייטען ווערען פאראורזאכט פון מיקרא-בען, ווי צום ביישפיעל, אין טובערקולאזיס, לונגען ענטציני-דונג, אינפלוענצא, און עהנליכע, איז נאך נויטיג דאס די בא-טרעפענדע מיקראבען זאלען זיך אריינכאפען אין קערפער און דער מענש ווערט שוין קראנק.

מען האט אבער באמערקט דאס פון א סך מענשען וועל-כע זיינען אויסגעזעצט דער געפאָהר פון אריינקריגען אין זיי-ער קערפער דיזעלבע מיקראבען ווערען נאך עטליכע קראנק און די אנדערע ניט.

דערפון האט מען זיך אָנגעשטויסען אז דער קערפער דארף זיין אין אזא צושטאנד וואס זאל מעגליך מאכען פאר די מיקראבען זיך צו ענטוויקלען און פאראורזאכען זייער שא-דען. אויף געזונט, גוט גענעהרטע און גוט-אויפגעפאסטע קערפערס האבען א סך קראנקהייטען קיין ווירקונג ניט. די נאטירליכע ווידערשטאנדס אָדער פארטיידיגונגס קרעפטען, וועלכע דער קערפער פארמאגט באשיצען איהם.

צוויי זאכען זיינען דארום נויטיג כדי זיך צו קאנען אויס-היטען פון קראנקהייטען. ערשטענס, אויב מען ווייסט וואס

עס פאראורזאכט די קראנקהייט, דארף מען אויסמיידען די דאזיגע אורזאכען. מען דארף אויך אויסמיידען יעדע זאך וואס די ערפאהרונג האט געציגט, דאס עס קאן זיין א מעגליכע אורזאכע פון דער באטרעפער קראנקהייט. און, צווייטענס, דארף מען אויפהאלטען דאס געזונט אין אלגעמיין אין א גוטען צושטאנד. אפהיימען דעם קערפער ער זאל זיין גוט גענעהרט, באשיצט געגען מעגליכע באשעדיגונגען, זיין ניט אויסגעמאטערט, ניט צופיעל אפגעשוואכט.

עס איז אויך דא א דריטער מיטעל. אבער דאס איז שוין אין פאל מען האט זיך ניט אויסגעהיט. דאס מיטעל איז ניט צו פארנאכאלעסיגען די פריהסטע סמנים פון אירגענד וועלכער אונגערעכט, כדי צו פארהימען אז א לייכטע קראנקהייט זאל זיך ניט ענטוויקלען אין אן ערנסטער.

איצט לאמיר זעהן ווי אזוי מען קאן אנווענדען די דאזיגע כללים צו קאנסער.

אייע פון די אורזאכען פאר קאנסער איז, ווי מען דענקט, א כראנישע רייצונג אין אירלענד (Ireland) צום ביי-שפיעל, באגעגענט מען א סך פאלען פון קאנסער אויף די ליפען. די איירישע רויכערען זעהר א סך פון קורצע, ליימע-נע לולקעס, (פייפס). מען דענקט דארום אז די הייסע ליי-מענע הענטלאך פון די לולקעס פאראורזאכען א רייצונג אין די הויט צעלען פון זייערע ליפען, און ווען די דאזיגע רייצונג האלט אן יאָהרען נאכאנאנד פיהרט עס צו דער ענטוויקלונג פון א קאנסער אויף א ליפ.

דארף מען דארום אויסמיידען יעדע סארט לאנג דויערנדע כראנישע רייצונג.

שארפע, שפיציגע, אפגעבראכענע אָדער אינפעקטיווע צייהן פאראורזאכען אפט א רייצונג אין מויל אָדער פון דער צונג. שלעכט צוגעפאסטע צייהן פלאמען פיהרען אפט צו וואונדען אין די יאָסלעס אָדער דעם גומען. א סך מענשען ליידען פון מויל-קאנסער. דארף מען דארום באזייטיגען און אויסמיידען אזעלכע אורזאכען פון א כראנישער רייצונג אין

מױל, ווי שלעכטע צייהן אָדער שלעכט-צוגעפּאַסטע צייהן-פּלאַטען.

הױט-קאַנסער ווערט אָפּט פּאַראַרזאכט פון אַ לאַנג-דױ-ערענדער רייצונג אין דער הױט דורך עטוואָס מיט וואָס די הױט קומט אין באַריהרונג. מען דאַרף האַרם דאָס אױסמײדען. די וועלכע קומען אין באַריהרונג מיט כעמישע שטאַפּען, ספּע-ציעל מיט קױהל-טאַר פּראָדוקטען, וועלכע רייצען די הױט זעהר שטאַרק, דאַרפּען זײַן באַזונדערס פּאַרזיכטיג, זיי דאַר-פּען זיך באַדען יעדען טאָג און האַלטען זייער הױט רײַן. מען טאַר אױך נישט אליין פּרובירען באַזײמיגען, מיט מעסער אָדער מיט כעמישע מיטלען, בראַדעווקעס אָדער אַנדערע הױט גע-וויקסען (מאַלס). קאַלירטע, (שוואַרצע) „מאַלס“ זײַנען אָפּט פּאַרגענגער פון הױט קאַנסערס.

אַ סך מענשען ליידען פון קאַנסער אין וישט און אין מאַגען. האַבענדיג אין זינען דאָס לאַנג דויערענדע רייצונגען קאַנען פּאַראַרזאכען אַזעלכע קאַנסערס דאַרף מען אױסמײדען יעדע זאַך וואָס קאָן פּאַראַרזאכען אזא רייצונג. הױסע שפּייזען, שטאַרק געווייזטע שפּייזען, שאַרפּע געטראַנקען, שלינגען נישט גוט-גענוג צוקײעטע שפּייז, עסען נישט פּאַרדייליכע שפּייזען און אַלעס וואָס קאָן פּאַראַרזאכען אַ רייצונג אָדער אַ כראָנישע ענטצינדונג אין מאַגען, דאַרף מען אױסמײדען.

די וואָס ליידען פון מאַגען ענטצינדונגען אָדער מאַגען „אַלסערס“ (וואַונדען) טאַרען עס נישט פּאַרנאַכלעסיגען. עס איז דאָ אַ מײנונגס פאַרשידענהײט צווישען דאָקטוירים ווע-גען דער פּראָגע צי אַ לאַנג-דויערנדער מאַגען-אַלסער (וואַונד) ווערט מיט דער צײט פאַרוואַנדעלט אין אַ קאַנסער געוויקס. מאַנכע דאָקטוירים (און אַזעלכע ערפּאָרטענע דאָקטוירים ווי די פּונם באַריהמטען מעיָא קליניק) גלױבען אַז יא. זיי דענ-קען דאָס די כראָנישע רייצונג פון די צעלען אַרום דער וואַונד אינ'ם מאַגען פאַרוואַנדעלט די דאָזיגע צעלען, מיט דער צײט, אין אַ קאַנסער געוויקס.

אַנדערע דאָקטוירים זײַנען נישט אײנשטימיג מיט אזא מײ-נונג. די צווייפלער דענקען דאָס אין די פּאלען אין וועלכע מען

געפינט א קאנסער געוויקס און א וואונד (אלסער) אינ'ם זעל-
בען מאָגען, איז די קראנקהייט כאלד אין אָנהויב געווען א
קאנסער געוויקס און די וואונד האָט זיך ענטוויקעלט דורך
דער צושטערונג פון די קאנסער-צעלען.

ווי דאָס זאָל ניט זיין, איז בעסער צו זיין צופיעל פאַרזיכ-
טיג איידער ניט פאַרזיכטיג גענוג. מענשען וועלכע ליידען
פון מאָגען אַלסערס (וואונדען) מאַרען זייער צושטאנד ניט
פארנאָכלעסיגען.

איך האָב שוין פריהער באַמערקט דאָס אַ סך פרויען ליי-
דען פון ברוסט-קאנסער און פון קאנסער אין דער געבעהר-
מוטער. ניט אַלע מאָל איז מעגליך זיך אויסצוהימען פון דער
קאנסער ענטוויקלונג אין די דאָזיגע קערפער טיילען. עס איז
אַבער יאָ מעגליך צו פאַרכאַפּען די קראנקהייט באַציימטענס
איידער זי פארגעהט צו ווייט.

יעדע גוליע אין א פרויען ברוסט קאָן זיין אַן אָנהויב פון
קאנסער. זיך מאַכען ניט וויסענדיג און וואַרטען צו זעהן וואָס
פון דער גוליע וועט ווערען מאַר מען ניט. אויסשניידען די גו-
ליע און זי אונטערזוכען איז דער זיכערסטער וועג ווי צו פאַר-
הימען די ענטוויקלונג פון ברוסט קאנסער.

דאָס זעלבע איז מיט אירגענד וועלכער אונאַרדנונג אַדער
פלוס אין דער געבעהר מוטער, ספּעציעל ביי מיטעל-יעהריגע
און עלטערע פרויען. אַ ציימיגע אונטערזוכונג קאָן העלפען
באַשטימען דעם כאַראַקטער פון דער קראנקהייט אַדער פאַר-
הימען אַ קאנסער געוויקס איידער עס ווערט צו שפּעט.

מיט איין וואָרט: אויפהאלטען דעם קערפער אין א גע-
זונטען צושטאנד. איהם ניט אויסמאטערען און ניט באשע-
דיגען מיט שעדליכע עסענס און געטראנקען. אויסמיידען יעדע
כראַנישע רייזונג אין אירגענד וועלכע טייל פון קערפער, און
ניט פאַרנאָכלעסיגען קיין אַבנאָרמאַליטעט וואָס מען באַ-
מערקט אין קערפער, דאָס זיינען די מיטלען און דאָס איז
דער וועג ווי אזוי אויסצומיידען, אויף ווי ווייט עס איז מעג-
ליך אויסצומיידען, די ענטוויקלונג פון קאנסער.

ב א ה א נ ד ל ו נ ג

קיינ „קויר“ פאר קאנסער איז נאך נישט. ביז איצט איז נאך נישט געלונגען אויסצוגעפינען אירגענד וועלכען מיטעל מיט וועלכען מען זאל קאנען באאיינפלוסען דעם וואקס פון קאנ-סער אדער דעם טויט פון קאנסער צעלען.

(איינ אויסנאם צו דעם כלל איז קאנסער פון דער פראסט-טאטע וועגען דעם וועל איך שרייבען א באזונדער קאפיטעל).

ביי היינטיגען טאג האבען מיר נאר צוויי וואפען געגען דער דאזיגער קראנקהייט: (1) דאס מעסער, און (2) די שטראה-לען פון רעדיום און די עקס-שטראהלען.

אין די פאלען אין וועלכע די קאנסער געוויקס איז נאך לאקאליזירט, און איז נישט אין א לעבענס וויכטיגען ארגאן, ווי דער לעבער אדער דער מארד, איז דער בעסטער און זיכער-סטער וועג ווי איהם צו באקעמפען — אויסשניידען די טייל קערפער אין וועלכען ער וואקסט. דער דערפאלג פון אזא אפעראציע ווענדעט זיך אן דעם צי זי ווערט געמאכט איי-דער די קאנסער-צעלען האבען זיך פארשפרייט אויך צו אנ-דערע טיילען פון קערפער. אויב מען געפינט שוין אועלכע קא-לאניעס פון קאנסער צעלען אין אנדערע קערפער-טיילען איז שוין צו שפעט פאר אן אפעראציע.

די עקס און די ראדיום שטראהלען ווערען גענוצט אין די פאלען אין וועלכע אן אפעראציע איז נישט ראטזאם אדער נישט אין גאנצען דערפאלגרייך. די ווירקונג פון די דאזיגע שטראהלען איז צו באשעדיגען אדער טוימען די קערפער צו-לען צו וועלכע זיי ווערען אנגעווענדעט. און אזוי ווי קאנסער צעלען זיינען יונגע צעלען זיינען זיי מעהר עמפפינדליך און ווערען גיכער באשעדיגט פון די שטראהלען ווי די געזונטע קערפער צעלען.

די צרה איז נאר וואס נישט אלע קאנסער צעלען באזיצען

דיזעלבע סענסיטיוויטעט צו די דאזיגע שטראהלען. אויף מאַן-
כע קאנסערס (ווי אין פאל פון אַסמיע-סארקאמא) האָבען די
עקס און ראדיום שטראהלען קיין שום ווירקונג ניט.

דאָס מעסער בלייבט נאָך אַלץ אונזער בעסטע וואָפע קע-
גען קאנסער. אָבער עס מוז אָנגעווענדעט ווערען באַצייטענע,
איידער עס ווערט צו שפעט. און דאָס איז דער שטארקסטער
אָרגומענט געגען וואַרטען צו לאַנג אין די פאלען אין וועלכע
מען פאַרדעכטיגט די עקזיסטענץ פון אַ קאנסער געוויקס.

פראַסטייט קאנסער

איין סאַרט קנסער וואָס מען קאָן יאָ קורירען.

די פראַסטייט איז אַ געשלעכטס דריזע וואָס געפינט זיך
נאָר ביי מענער. איהר פלאץ איז אַרום נאָקען פונ'ם וואַסער
בלאָדער (אורין-זאק). ביי עלטערע מענער ווערט די דאזיגע
דריזע פאַרגרעסערט און פאַרהאַרטעוועט, דאָס פיהרט צו
פאַרשמעלערונג פון אורין קאנאַל וואָס פיהרט די אורין פנ'ם
בלאָדער. דער רעזולטאַט איז דאָס דער וואַסער בלאָדער קאָן
זיך ניט אין גאַנצען אויסליידיגען און דער מאַן מוז אָפט לאָ-
זען צוביסלאך וואַסער. אַזא מאַן'ס שלאָף ווערט אָפט גע-
שטערט, ווייל ער דאַרף אויפשטעהן עטליכע מאל ביינאַכט
צו לאָזען וואַסער.

די דאזיגע דריזע, די פראַסטייט איז אויסגעזעצט צו דער
געפאָהר עס זאָל זיך אין איהר ענטוויקלען קאנסער און ווען
דאָס פאַסירט פאַרשפרייט זיך די געוויקס צו די אַרומיגע קער-
פער טיילען און צו די ביינער פונ'ם בעקען.

אָבער די דאזיגע קאנסער געוויקס קאָן קאנטראָלירט און
זאָגאַר קורירט ווערען דורך ענדערען די געשלעכטס האַרמאָ-
נען אין קערפער.

די פראַסטייט, ווי שוין געזאָגט, איז אַ מעגליכע גע-
שלעכטס-דריזע. גיט מען אַזא מאַן גרויסע דאָזעס פון ווייב-

ליכע געשלעכטס-הארמאנען ווערען די קאנסער צעלען פון דער פראסטאטע איינגעשרומפפן און שטארבען אָפּ.

די דאָזיגע באַהאַנדלונג פון קאנסער אין דער פראסטאטע גיט אונז גוטע האַפנונגען דאָס מיט דער צייט וועט מען מעגליך קאנען קורירען קאנסער אין דער געבעהר מוטער אָדער ברוסט קאנסער ביי פרויען מיט דער הילף פון מעגליכע געשלעכטס-הארמאנען, און אפשר וועט מען מיט דער צייט אויך קאנען אויסגעפינען אנדערע מיטלען ווי אזוי צו מאכען אונמעגליך פאר די קאנסער צעלען צו וואקסען אין אנדערע קערפער טיילען. לאַמיר האַפען אז דאָס וועט זיין אזוי. פאַר-לויפּיג איז קאנסער אין דער פראסטאטע דער איינציגער קאנ-סער געגען וועלכען מיר האָבען אויסגעפונען אַ ווירקזאמען מיטעל.

ר ע ו מ ע :

קאנסער איז אַ געוויקס פון פרימיטיווע צעלען אין אַ טייל פון קערפער וואו זיי באַלאַנגען ניט.

די קראַנקהייט איז ניט קיין אַנשמעקענדע. און זי געהט ניט איבער בירושה. מען דאַרף ניט מורא האָבען צו קומען אין נאָהענטער באַריהרונג מיט קאנסער קראַנקע. און קינדער, אָדער נאָהענטע קרובים פון קאנסער ליידענדע דארפֿען זיך ניט שרעקען.

בראַנישע לאַנג דויערנדע רייצונגען אויף אירגענד וועל-כע טייל פון קערפער ווערען באַטראַכט אלס מעגליכע פאַר-אורזאַכער פון דער קראַנקהייט. מען דאַרף דאָרום אויסמיידען אזעלכע רייצונגען, און אין דערוועלבער צייט דאַרף מען אויפ-האלטען דעם קערפער אין אלגעמיין אין אַ געזונטען פיינעם און גוט גענעהערטען צושטאַנד ער זאָל זיך קענען באַשיצען גע-גען יעדער סאַרט חולאת.

דורך גרינדליכע פיזישע אונטערזוכונגען, דורכגעפיהרט פערצאָדיש, און מיט דער הילף פון לאבאראטאָרי פראַכעס און

עקס רעי בילדער קאָן מען פעסטשמעלען צי איינער ליידעט פון קאַנסער אָדער ניט, אָדער צי דאָס אויף וואָס דער מענש באַקלאַגט זיך אָן זיין אן אנדייטונג אויף קאַנסער. עס לוינט זיך דאָרום ניט צו זיין אין צווייפעל און וואַרטען ביז די סמנים פון דער קראַנקהייט זענען שוין אזוי דייטליך אז עס קאָן מעהר קיין פראַגע ניט זיין וועגען דער דייעגנאָזיס פון קאַנסער. אויב מען וואַרט אזוי לאַנג איז געוועהנליך שוין צו שפּעט צו העלפען דעם קראַנקען.

דורך אַפּטע פעריאָדישע פיזישע אונטערזוכונגען קאָן מען אויסגעפינען מעגליכע פּאַלען פון קאַנסער נאָך איידער די קראַנקהייט ניט דייטליכע סמנים, און דורך פריהצייטיגע בע-האַנדלונגען קאָן מען. אין אַזעלכע אָנהויב-פּאַלען פון קאַנסער, פּאַלשמענדיג קורירען די קראַנקהייט איידער זי האָט צייט גע-האַט זיך צו פארשפּרייטען צו אנדערע טיילען פון קערפּער.



א י נ ה א ל ט :

- 2 פארווארט
3 וואס פאר א קראנקהייט איז קאנסער?
7 טיומאר און קאנסער
10 איז קאנסער א ירושה קראנקהייט?
11 איז קאנסער אן אַנשטעקענדע קראנקהייט?
12 אַ בינמל קאנסער ציפערען
13 אורזאכען פון קאנסער
16 פארשיידענע סארטען קאנסער
18 די סמנים פון קאנסער
20 די מורא צו וויסען דעם אמת
24 קאן מען זיך אויסהימען פון קאנסער?
28 באהאנדלונגען פון קאנסער
29 אַ קאנסער וואָס מען קאן קורירען
30 רעזומע

